

## **PATO BRANCO SE PREPARA PARA A VACINAÇÃO AO GRUPO DE COMORBIDADES**

O grupo com comorbidades será o próximo a ser vacinado contra a covid-19, após o encerramento da vacinação aos idosos.

De acordo com a secretaria de saúde, embora não haja imunizantes disponíveis, é importante que as pessoas já tenham conhecimento de como ocorrerá a vacinação no município.

### **Na fase I da segunda etapa de vacinação serão contemplados:**

- Pessoas com Síndrome de Down, de 18 até 59 anos;
- Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) de 18-59 anos;
- Gestantes e puérperas – até 45 dias pós parto com comorbidades (\*\*VER ÍTEM DE COMORBIDADE), de 18 até 59 anos;
- Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos\*\*;
- Pessoas com Deficiência Permanente de 55 a 59 anos.

**Na fase II serão vacinados, de acordo com o quantitativo de doses disponível, segundo as faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos:**

- Pessoas com comorbidades\*\*;
- Pessoas com Deficiência Permanente;
- Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes

### **\*\* Descrição de comorbidades:**

- **Diabetes;**
- **Pneumopatias:** Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática);
- **Hipertensão arterial resistente:** Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos. Hipertensão arterial estágio 3 PA sistólica  $\geq 180$ mmHg e/ou diastólica  $\geq 110$ mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade. Hipertensão arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade;
- **Doenças cardiovasculares:** Insuficiência cardíaca (IC); Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar; Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo). Síndromes coronarianas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras); Valvopatias. Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressinchronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência)
- **Doença cerebrovascular:** AVC isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular;
- **Doença renal crônica estágio 3 ou mais;**
- **Imunossuprimidos:** Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com

imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas;

- **Anemia Falciforme;**
- **Obesidade Mórbida (IMC maior ou igual a 40) ;**
- **Síndrome de Down;**
- **Cirrose Hepática.**

Para esta etapa de vacinação, será realizado um cronograma de datas para cada grupo contemplado a ser vacinado, sem necessidade de agendamento prévio. As aplicações serão realizadas em todas as unidades de saúde do Município. Pacientes pertencentes a áreas cobertas por Estratégia de Saúde da Família deverão realizar a vacinação nas salas de vacinas das unidades de saúde. Pacientes da região central serão vacinados na sala de vacina central conforme cronograma de dias divulgados. Os cronogramas de vacinação dependerão do quantitativo de doses recebidas. Os mesmos poderão ser alterados caso haja falta dos imunizantes.

Os documentos exigidos para a vacinação são:

- Exame que comprove a comorbidade;
- Receita médica que comprove o uso de medicamento para tal comorbidade;
- Declaração médica COM DESCRIÇÃO DA COMORBIDADE DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DO PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO (DETALHAR QUAL A COMORBIDADE QUE O PACIENTE APRESENTA) + CID (obrigatório) – principalmente para pacientes que acompanham na rede particular, pois são pacientes em que a comorbidade não consta em prontuário municipal;
- As unidades de saúde, que mantém o cadastro e acompanhamento atualizados do paciente, poderão utilizar-se da consulta ao prontuário eletrônico.

O Município ressalta ainda algumas orientações:

- A vacina somente está indicada para maiores de 18 anos;
- Pacientes com Histórico de covid: deverá preconizar intervalo de 30 dias entre a data do diagnóstico e a vacina;
- Deverá ser preconizado o intervalo de 14 dias entre outras vacinas (como influenza, antitetânica e outras);
- Pacientes em acompanhamento com reumatologista e oncologista (em tratamento com doses imunossupressoras): apresentar receita médica

Atenciosamente,

Emanoeli Stein  
Coordenadora do Programa Municipal de imunização